


The FMC logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The 'F' is stylized with a horizontal bar extending to the left. The letters 'M' and 'C' are also in a bold, sans-serif font.

PROTECT FOR BETTER GROWTH

# Spotlight® Plus

Herbicida

A photograph of an almond orchard during bloom. The trees are covered in pink blossoms. Several white circles are overlaid on the image, indicating specific areas where the herbicide is applied. The background shows a clear blue sky with some clouds. The bottom of the image features a curved transition to a dark green background with a pile of almonds.

**ALTA EFICACIA CONTRA MALAS HIERBAS  
DICOTILEDÓNEAS Y REBROTOS**

**Spotlight® Plus** es un herbicida de contacto, para aplicación en postemergencia destinado al control de malas hierbas dicotiledóneas y rebrotos en almendro y otras especies leñosas.

# Spotlight® Plus

## Un herbicida que aporta muchas ventajas

<b>COMPOSICIÓN</b>	Carfentrazona etil 6% p/v
<b>FAMILIA QUÍMICA</b>	Triazolinona
<b>GRUPO HRAC</b>	E
<b>FORMULACIÓN</b>	Microemulsion (ME)
<b>MODO DE ACCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Actúa inhibiendo la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO).</li> <li>› Actúa rápidamente sobre especies dicotiledóneas siendo su rapidez de acción directamente proporcional a la intensidad luminosa.</li> </ul>
<b>TIPO DE ACTIVIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Herbicida de contacto, no sistémico.</li> <li>› Absorción foliar. No residual. Potente efecto secante.</li> <li>› Efecto herbicida sobre tejidos fotosintéticos, no lignificados.</li> </ul>
<b>Nº REGISTRO</b>	25453
<b>ENVASES</b>	1 litro y 5 litros

H.R.A.C.: Comité de Prevención de Resistencia a Herbicidas.

## Espectro de control herbicida

### BUENA EFICACIA

*Anacyclus sp.*  
*Amaranthus blitoides*  
*Amaranthus hybridus*  
*Amaranthus retroflexus*  
*Beta vulgaris* spp. maritima  
*Chenopodium album*  
*Convolvulus arvensis*  
*Daucus carota*  
*Conyza bonariensis*  
*Erodium sp.*  
*Galium aparine*  
*Geranium carolinianum*  
*Geranium molle*  
*Mercurialis annua*  
*Lactuca serriola*  
*Portulaca oleracea*  
*Raphanus raphanistrum*  
*Senecio vulgaris*  
*Sinapis sp.*  
*Solanum nigrum*  
*Sonchus arvensis*  
*Urtica urens*  
*Veronica hederifolia*  
*Veronica persica*  
*Veronica sp.*

### EFICACIA MODERADA

*Calendula arvensis*  
*Cirsium arvense*  
*Euphorbia sp.*  
*Melilotus sp.*  
*Rumex acetosa*  
*Rumex crispus*  
*Sonchus asper*  
*Taraxacum officinale*

## Dosis y momento de aplicación

- **Control de malas hierbas dicotiledóneas**
  - › Momento: aplicar en postemergencia
  - › Dosis: 0,25-0,3 L/ha
  - › Volumen de caldo: de 300-500 L/ha
- **Control de vástagos y chupones**
  - › Momento: antes de la lignificación (<15 cm)
  - › Dosis: 0,9 L/ha
  - › Volumen de caldo: de 300-500 L/ha

En ambos casos, es importante evitar derivas para que no se produzcan efectos fitotóxicos en el cultivo de almendro.



## Recomendaciones de empleo

- **Evitar el contacto directo con las hojas y las partes verdes del cultivo.**
- **Aplicar con presiones bajas (< 3 atmósferas).**
- **Pulverizar con tamaño de gota grande.**
- **Utilizar boquillas adecuadas.**
  - Utilizar preferiblemente boquillas antideriva o de inyección de aire, con un ángulo máximo de 80°.
  - No utilizar nunca boquillas de turbulencia.
  - Si se utilizan boquillas normales, mezclar con adyuvantes específicos antideriva.
  - En todos los caso, trabajar con la menor presión posible que permita la boquilla, con el fin de evitar / reducir el número de gotas finas.
- **Aplicar con campana protectora.**
- **No aplicar en días ventosos (velocidad < 15 km/hora).**
- **Emplear velocidades de avance adecuadas.**
  - 4-6 km/hora como máximo / 50-80 L/km

# FMC

Pº de la Castellana, 257 - 5º - 28046 MADRID  
**91 553 01 04**  
[www.fmcagro.es](http://www.fmcagro.es)



Con el fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, antes de aplicar un producto fitosanitario, lea atentamente la etiqueta y siga estrictamente las instrucciones de uso.