BENEFICIOS

1

Amplio espectro de acción sobre gramíneas y dicotiledóneas, incluidas *Matricaria* sp., *Galium aparine* y *Capsella bursa-pastoris*, *Lolium* sp., *Poa* sp.,….

Base sólida para un herbicida de pre-emergencia en colza.

2

Alternancia y diversificación en el uso de diferentes moléculas dentro de una rotación de cultivo.

Manejo de resistencias.

3

Utilizable solo o con otros herbicidas complementarios en función de las malas hierbas existentes.

Se adapta plenamente a un programa herbicida para cualquier parcela.

4

Eficacia Contrastada.

Sinergia demostrada entre los ingredientes activos de NERO.

FMC

Pº de la Castellana, 257-5º. 28046 Madrid
91 553 01 04

NERO®

NUEVO HERBICIDA PARA COLZA

FMC

CARACTERÍSTICAS

NERO® es el nuevo herbicida de FMC con actividad en el suelo para el control del espectro de malas hierbas gramíneas y de hoja ancha en pre-emergencia en colza formulado en forma de concentrado emulsionable [EC].

NERO® está compuesto por dos ingredientes activos, de FMC, con espectro de acción complementario y diferente modo de acción convirtiéndolo en una eficaz herramienta para la estrategia de control de especies resistentes.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y AGRONÓMICAS

400 g/L PETOXAMIDA
Pertenece al Grupo Químico de las Cloroacetamidas (Grupo K3, HRAC).
Sistémico.
Actúa inhibiendo la elongación de los ácidos grasos y, por tanto, la división celular.
Se absorbe por raíces, hipocotilo, cotiledones y brotes jóvenes.

+

24 g/L CLOMAZONA
Pertenece al grupo Químico de las Isoxazolidinonas (Grupo F4, HRAC).
Actúa inhibiendo la síntesis de pigmentos en especies susceptibles.
Absorbido por raíces y brotes.

ESPECTRO DE ACCIÓN

NERO® es un herbicida de pre-emergencia eficaz frente a las principales especies de hoja ancha y estrecha que se encuentran en el cultivo de la colza:



MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante pulverización mecánica a baja presión en pre-emergencia del cultivo con un volumen de caldo de 200-400 L/ha.

CULTIVO	MALAS HIERBAS	MOMENTO	DOSIS	PS
Colza	Gramíneas y dicotiledóneas	Pre-emergencia	3,0 L/ha	No procede



Para el correcto control de las malas hierbas y dado que se trata de ingredientes activos con actividad pre-emergente a la hora de realizar la dosificación del producto deberá tenerse en cuenta los contenidos en materia orgánica siendo necesario aplicar la dosis completa en caso de situaciones de alta materia orgánica o siembras directas. Del mismo modo, será necesario tener suficiente humedad en el suelo para optimizar la eficacia del producto. Se realizará un máximo de una aplicación cada 3 años.

SELECTIVIDAD

NERO® ha demostrado ser selectivo en todas las variedades de colza ensayadas. Sin embargo, es posible observar leves síntomas transitorios de decoloración en las hojas pocas semanas después de la emergencia recuperándose el cultivo con normalidad.



Resultados de 18 ensayos de selectividad de cultivo

No mezclar con abonos que contengan azufre.

En caso de fallo del cultivo en una aplicación de otoño, puede volverse a plantar colza o leguminosas. Para cualquier otro cultivo se recomienda esperar 90 días para una posible siembra de cualquier cultivo de ciclo corto y alrededor de 30 días entre siembra/plantación y cosecha. Si la aplicación se realiza en primavera, pueden sembrarse colza, maíz, girasol, patatas, judías, guisantes y alfalfa. Si se realiza una labor a 15 cm, también puede sembrarse trigo, avena, Lolium y remolacha.